

TROUSSE ALLOPATHIQUE de voyage

Minimum vital pour pouvoir parer à pas mal de soucis de santé avec ou sans un conseil médical

AMOXICILLINE ALMUS 500 mg Gélule Boîte de 12

1 gélule 1 fois par jour à midi pendant les repas pendant 8 jours
ANGINE BRONCHITE OTITE Attention = PENICILLINE

COTRIMOXAZOLE RATIOPHARM 800 mg/160 mg Comprimé Boîte de 10

1 comprimé 2 fois par jour le matin et le soir pendant les repas pendant 8 jours
SINUSITE BRONCHITE CYSTITITE

OFLOXACINE ALMUS 200 mg Comprimé Boîte de 10 / CYSTITITE

1 comprimé matin et soir pendant 5 jours.

SMECTA Poudre pour suspension buvable Sachet Boîte de 30 / DIARRHÉE

1 sachet-dose 3 fois par jour le matin, à midi et le soir pendant 5 jours

LOPERAMIDE ARROW 2 mg Gélule Boîte de 20 / COLIQUES

1 gélule 1 à 6 fois par jour le matin pendant 1 à 3 jours

METOCLOPRAMIDE MERCK 10 mg Comprimé Boîte de 40 / NAUSEES VOMISSEMENTS

1 comprimé 3 fois par jour le matin, à midi et le soir avant les repas pendant 1 à 3 jours

PARACÉTAMOL 1 000 mg Comprimé (DCI) [p.e. DOLIPRANE 1 000MG CPR 8]

1 comprimé 3 fois par jour

PARACÉTAMOL 300 mg Poudre pour solution buvable (DCI) [p.e. DOLIPRANE 300MG SACHET 12]

1 sachet à renouveler si besoin au bout de 4 heures. Maximum 6 sachets par jour. A diluer dans un peu d'eau, lait ou jus de fruit.

HOMEOPTIC Collyre Boîte de 10 Récipients unidoses de 0.4 ml / IRRITATION CONJONCTIVES

1 goutte 5 fois par jour le matin, à 10 heures, à midi, à 16 heures et le soir pendant 5 jours

BETADINE DERMIQUE 10 % Solution pour usage local Flacon de 125 ml

1 application avec le produit pur ou dilué.

EOSINE AQUEUSE COOPER 2 % Solution pour usage local Bte de 10 Récipients unidoses de 2 ml

1 application 1 à 2 fois par jour directement ou à l'aide d'une compresse. Utiliser dans les 48 heures après ouverture.

FUCIDINE 2 % Crème Tube de 15 g / CREME ANTIBIOTIQUE

1 application 2 fois par jour le matin et le soir

AMYCOR 1 % Crème Tube de 15 g / CREME ANTIMYCOSIQUE

1 application 2 fois par jour le matin et le soir pendant 5 jours

BIAFINE Emulsion Tube de 93 g

1 application 2 à 3 fois par jour en massant légèrement.
IRRITATIONS BRULURE

POSTHELIOS REPARAT AP/SOL 200ML / COUP DE SOLEIL

ALCOOL 70C MODIFIE COOP 125ML / DESINFECTION

COMP ST 10 ABSOPLAIE 10X20 / NYLEXOGRIP BLANC 7CMX3M BANDAGE

URGODERM 10MX10CM / BANDAGE et SURGIFIX N3 3M POIGNET / BANDAGE